




Planter local ?

Arbres et arbustes du Centre-Val de Loire



Gâtine des confins Touraine Berry



IX. Gâtine des Confins Touraine Berry

1. Les arbrisseaux et les lianes (hauteur à l'âge adulte inférieure à 1 m)

 Plantation de haie  Boisements  Bords de cours d'eau, de mares et d'étangs  Couleurs des fleurs présentant un intérêt esthétique  Espèce mellifère  Espèce allergisante					
	Ajonc d'Europe <i>Ulex europaeus</i> L.		Utilisations possibles  		
	Caractéristiques principales Feuillage Période de floraison Humidité du sol pH du sol Exposition <i>Persistant</i> <i>Mars à juillet</i> <i>Sec à frais</i> <i>Acide</i> <i>Pleine lumière</i>		Particularités - Espèce mellifère   - Plante fourragère après broyage - Toxique pour l'humain		
	Ajonc nain <i>Ulex minor</i> Roth		Utilisations possibles 		
	Caractéristiques principales Feuillage Période de floraison Humidité du sol pH du sol Exposition <i>Persistant</i> <i>Juillet à octobre</i> <i>Frais à très humide</i> <i>Acide</i> <i>Pleine lumière</i>		Particularités - Espèce mellifère  - Toxique pour l'humain		
	Chèvrefeuille des bois <i>Lonicera periclymenum</i> L.		Utilisations possibles  		
	Caractéristiques principales Feuillage Période de floraison Humidité du sol pH du sol Exposition <i>Caduc</i> <i>Juin à août</i> <i>Assez sec à humide</i> <i>Acide à faiblement calcaire</i> <i>Lumière à mi-ombre</i>		Particularités - Fruits comestibles pour la faune - Espèce mellifère  - Toxique pour l'humain - Fleurs odorantes		



Fragon petit-houx

Ruscus aculeatus L.

Utilisations possibles



Caractéristiques principales

Feuillage *Persistant*
Période de floraison *Janvier à avril*
Humidité du sol *Très sec à frais*
pH du sol *Faiblement acide à calcaire*
Exposition *Mi-ombre à ombre*

Particularités

- Propriétés médicinales
- Baies toxiques pour l'Homme



Lierre

Hedera helix L.

Utilisations possibles



Caractéristiques principales

Feuillage *Persistant*
Période de floraison *Septembre-octobre*
Humidité du sol *Sec à humide*
pH du sol *Acide à calcaire*
Exposition *Pleine lumière*

Particularités

- Fruits comestibles pour la faune
- Espèce mellifère 
- Plante couvre-sol
- Toxique pour l'Homme



2. Les arbustes (hauteur à l'âge adulte inférieure à 7m)



Plantation
de haie



Boisements



Bords de cours
d'eau, de mares
et d'étangs



Couleurs
des fleurs
présentant
un intérêt
esthétique



Espèce
mellifère



Espèce
allergisante



Aubépine à deux styles

Crataegus laevigata (Poir.) DC.

Utilisations possibles



Caractéristiques principales

Feuillage *Caduc*
Période de floraison *Avril-mai*
Humidité du sol *Frais à humide*
pH du sol *Faiblement acide à calcaire*
Exposition *Lumière à mi-ombre*

Particularités

- Fruits comestibles pour la faune
- Espèce mellifère 
- Bon combustible
- Porte-greffe
- Maladie : feu bactérien
- Soumise à Passeport Phytosanitaire Européen ([DRAAF](#))



Aubépine à un style

Crataegus monogyna Jacq.

Utilisations possibles



Caractéristiques principales

Feuillage *Caduc*
Période de floraison *Mai*
Humidité du sol *Très sec à assez humide*
pH du sol *Très variable*
Exposition *Lumière à mi-ombre*

Particularités

- Fruits comestibles pour la faune
- Espèce mellifère 
- Bon combustible
- Porte-greffe
- Maladie : Feu bactérien





Bourdaïne

Frangula alnus Mill.

Utilisations possibles



Caractéristiques principales

Feuillage	<i>Caduc</i>
Période de floraison	<i>Mai</i>
Humidité du sol	<i>Sec à très humide</i>
pH du sol	<i>Acide à calcaire</i>
Exposition	<i>Lumière à mi-ombre</i>

Particularités

- Fruits comestibles pour la faune
- Espèce mellifère
- Toxique pour l'humain
- Utilisé en vannerie



Bruyère à balais

Erica scoparia L.

Utilisations possibles



Caractéristiques principales

Feuillage	<i>Persistant</i>
Période de floraison	<i>Mai à juillet</i>
Humidité du sol	<i>Assez sec à assez humide</i>
pH du sol	<i>Acide</i>
Exposition	<i>Pleine lumière</i>

Particularités

- Espèce mellifère
- Utilisé pour la fabrication de balais et de clôtures



Fusain d'Europe

Evonymus europaeus L.

Utilisations possibles



Caractéristiques principales

Feuillage	<i>Caduc</i>
Période de floraison	<i>Avril-mai</i>
Humidité du sol	<i>Sec à frais</i>
pH du sol	<i>Faiblement acide à calcaire</i>
Exposition	<i>Lumière à mi-ombre</i>

Particularités

- Espèce mellifère
- Toxique pour l'humain
- Fruits rose-violacés persistant longtemps sur l'arbuste
- Charbon de bois ferme, outil de dessin (fusain)



Genêt à balais

Cytisus scoparius (L.) Link

Utilisations possibles



Caractéristiques principales

Feuillage	<i>Caduc</i>
Période de floraison	<i>Mai à juillet</i>
Humidité du sol	<i>Assez sec à frais</i>
pH du sol	<i>Acide</i>
Exposition	<i>Pleine lumière</i>

Particularités

- Espèce mellifère
- Toxique pour l'humain
- Attention à ne pas utiliser la sous-espèce horticole *reverchonii*



Genévrier commun

Juniperus communis L.

Utilisations possibles



Caractéristiques principales

Feuillage	<i>Persistant</i>
Période de floraison	<i>Avril-mai</i>
Humidité du sol	<i>Sec</i>
pH du sol	<i>Très variable</i>
Exposition	<i>Pleine lumière</i>

Particularités

- Fruits comestibles pour la faune
- Espèce allergisante
- Utilisation des baies (liqueur, condiments)



Groseiller rouge

Ribes rubrum L.

Utilisations possibles



Caractéristiques principales

Feuillage	<i>Caduc</i>
Période de floraison	<i>Avril-mai</i>
Humidité du sol	<i>Humide</i>
pH du sol	<i>Faiblement acide à neutre</i>
Exposition	<i>Mi-ombre</i>

Particularités

- Espèce mellifère 
- Fruits comestibles (groseilles)



Houx

Ilex aquifolium L.

Utilisations possibles



Caractéristiques principales

Feuillage	<i>Persistant</i>
Période de floraison	<i>Mai-juin</i>
Humidité du sol	<i>Assez sec à humide</i>
pH du sol	<i>Très variable</i>
Exposition	<i>Mi-ombre</i>

Particularités

- Fruits comestibles pour la faune
- Espèce mellifère 
- Toxique pour l'humain



Néflier

Crataegus germanica (L.) Kuntze

Utilisations possibles



Caractéristiques principales

Feuillage	<i>Caduc</i>
Période de floraison	<i>Mai-juin</i>
Humidité du sol	<i>Assez sec à frais</i>
pH du sol	<i>Acide</i>
Exposition	<i>Lumière à mi-ombre</i>

Particularités

- Espèce mellifère 
- Fruits comestibles blets (nèfles)
- Porte-greffe d'arbres fruitiers
- Maladie : Feu bactérien



Nerprun purgatif

Rhamnus cathartica L.

Utilisations possibles



Caractéristiques principales

Feuillage	<i>Caduc</i>
Période de floraison	<i>Mai-juin</i>
Humidité du sol	<i>Sec</i>
pH du sol	<i>Faiblement acide à calcaire</i>
Exposition	<i>Lumière à mi-ombre</i>

Particularités

- Fruits comestibles pour la faune
- Toxique pour l'humain



Noisetier, Coudrier

Corylus avellana L.

Utilisations possibles




Caractéristiques principales

Feuillage	<i>Caduc</i>
Période de floraison	<i>Janvier à mars</i>
Humidité du sol	<i>Sec à assez humide</i>
pH du sol	<i>Faiblement acide à neutre</i>
Exposition	<i>Mi-ombre à ombre</i>

Particularités

- Espèce allergisante 
- Fruits comestibles (noisettes)
- Assez bon combustible



Prunellier

Prunus spinosa L.

Utilisations possibles




Caractéristiques principales

Feuillage	Caduc
Période de floraison	Avril
Humidité du sol	Sec à très humide
pH du sol	Faiblement acide à calcaire
Exposition	Lumière à mi-ombre

Particularités

- Espèce mellifère
- Fruits comestibles à l'état blet (prunelles), parfois distillés
- Porte-greffe d'arbres fruitiers



Rosier des champs

Rosa arvensis Huds.

Utilisations possibles



Caractéristiques principales

Feuillage	Caduc
Période de floraison	Juin-juillet
Humidité du sol	Sec à frais
pH du sol	Acide à calcaire
Exposition	Mi-ombre

Particularités

- Espèce mellifère



Saule cendré

Salix cinerea L.

Utilisations possibles




Caractéristiques principales

Feuillage	Caduc
Période de floraison	Mars-avril
Humidité du sol	Humide
pH du sol	Très variable
Exposition	Pleine lumière

Particularités

- Espèce mellifère
- Espèce allergisante



Saule marsault

Salix caprea L.

Utilisations possibles



Caractéristiques principales

Feuillage	Caduc
Période de floraison	Mars-avril
Humidité du sol	Frais à très humide
pH du sol	Acide à neutre
Exposition	Pleine lumière

Particularités

- Espèce mellifère
- Espèce allergisante



Saule roux

Salix atrocinerea Brot.

Utilisations possibles



Caractéristiques principales

Feuillage	Caduc
Période de floraison	Mars-avril
Humidité du sol	Sec à très humide
pH du sol	Acide
Exposition	Pleine lumière

Particularités

- Espèce mellifère
- Espèce allergisante



Sureau noir

Sambucus nigra L.

Utilisations possibles



Caractéristiques principales

Feuillage	Caduc
Période de floraison	Juin-juillet
Humidité du sol	Assez sec à humide
pH du sol	Faiblement acide à calcaire
Exposition	Mi-ombre à lumière

Particularités

- Fruits comestibles pour la faune
- Espèce mellifère
- Fruits comestibles cuits (distillerie, confitures)
- Fleurs très odorantes, utilisées en cuisine





Troène commun

Ligustrum vulgare L.

Utilisations possibles



Caractéristiques principales

Feuillage	<i>Caduc ou marcescent</i>
Période de floraison	<i>Mai-juin</i>
Humidité du sol	<i>Sec à frais</i>
pH du sol	<i>Neutre à calcaire</i>
Exposition	<i>Lumière ou demi-ombre</i>

Particularités

- Fruits comestibles pour la faune
- Espèce mellifère
- Espèce allergisante
- Toxique pour l'humain
- Fleurs très odorantes



Viorne lantane

Viburnum lantana L.

Utilisations possibles



Caractéristiques principales

Feuillage	<i>Caduc</i>
Période de floraison	<i>Mai-juin</i>
Humidité du sol	<i>Sec à frais</i>
pH du sol	<i>Neutre à calcaire</i>
Exposition	<i>Lumière à mi-ombre</i>

Particularités

- Fruits comestibles pour la faune
- Espèce mellifère



Viorne obier

Viburnum opulus L.

Utilisations possibles



Caractéristiques principales

Feuillage	<i>Caduc</i>
Période de floraison	<i>Mai-juin</i>
Humidité du sol	<i>Frais à très humide</i>
pH du sol	<i>Faiblement acide à calcaire</i>
Exposition	<i>Lumière à mi-ombre</i>

Particularités

- Fruits comestibles pour la faune
- Espèce mellifère
- Toxique pour l'Homme



3. Les arbres (hauteur à l'âge adulte supérieure à 7 m)



Plantation de haie



Boisements



Bords de cours d'eau, de mares et d'étangs



Couleurs des fleurs présentant un intérêt esthétique



Espèce mellifère



Espèce allergisante



Alisier torminal

Sorbus torminalis (L.) Crantz

Utilisations possibles



Caractéristiques principales

Feuillage	<i>Caduc</i>
Période de floraison	<i>Mai</i>
Humidité du sol	<i>Assez sec à frais</i>
pH du sol	<i>Très variable</i>
Exposition	<i>Pleine lumière</i>

Particularités

- Fruits comestibles pour la faune
- Espèce mellifère
- Fruits parfois distillés
- Excellent combustible
- Maladie : Feu bactérien



Aulne glutineux

Alnus glutinosa (L.) Geartn.

Utilisations possibles




Caractéristiques principales

Feuillage	<i>Caduc</i>
Période de floraison	<i>Mars-avril</i>
Humidité du sol	<i>Très humide</i>
pH du sol	<i>Acide à calcaire</i>
Exposition	<i>Lumière à mi-ombre</i>

Particularités

- Graines comestibles pour la faune
- Espèce allergisante
- Bois imputrescible





Bouleau verruqueux

Betula pendula Roth

Utilisations possibles



Caractéristiques principales

Feuillage	<i>Caduc</i>
Période de floraison	<i>Avril-mai</i>
Humidité du sol	<i>Très variable</i>
pH du sol	<i>Acide à faiblement calcaire</i>
Exposition	<i>Pleine lumière</i>

Particularités

- Graines comestibles pour la faune
- Espèce allergisante ●●●
- Bon combustible



Charme

Carpinus betulus L.

Utilisations possibles



Caractéristiques principales

Feuillage	<i>Caduc</i>
Période de floraison	<i>Avril-mai</i>
Humidité du sol	<i>Assez sec à frais</i>
pH du sol	<i>Faiblement acide à neutre</i>
Exposition	<i>Mi-ombre à ombre</i>

Particularités

- Espèce allergisante ●●●
- Excellent combustible
- Bon brise-vent



Châtaignier

Castanea sativa Mill.

Utilisations possibles




Caractéristiques principales

Feuillage	<i>Caduc</i>
Période de floraison	<i>Juin-juillet</i>
Humidité du sol	<i>Assez sec à frais</i>
pH du sol	<i>Acide</i>
Exposition	<i>Lumière à mi-ombre</i>

Particularités

- Espèce mellifère ●●●
- Espèce allergisante ●●●
- Fruits comestibles (châtaignes)
- Ravageur : Cynips du Châtaignier (insecte parasite)



Chêne pédonculé

Quercus robur L.

Utilisations possibles




Caractéristiques principales

Feuillage	<i>Caduc</i>
Période de floraison	<i>Avril-mai</i>
Humidité du sol	<i>Assez sec à humide</i>
pH du sol	<i>Acide à neutre</i>
Exposition	<i>Pleine lumière</i>

Particularités

- Fruits comestibles pour la faune
- Espèce mellifère ●●●
- Espèce allergisante ●●●
- Bon combustible



Chêne pubescent

Quercus pubescens Wild.

Utilisations possibles



Caractéristiques principales

Feuillage	<i>Caduc</i>
Période de floraison	<i>Avril</i>
Humidité du sol	<i>Sec</i>
pH du sol	<i>Faiblement acide à calcaire</i>
Exposition	<i>Pleine lumière</i>

Particularités

- Fruits comestibles pour la faune
- Espèce mellifère ●●●
- Espèce allergisante ●●●
- Le meilleur des chênes truffiers
- Bon combustible



Chêne sessile

Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.

Utilisations possibles



Caractéristiques principales

Feuillage	<i>Caduc</i>
Période de floraison	<i>Mai</i>
Humidité du sol	<i>Sec à frais</i>
pH du sol	<i>Très variable</i>
Exposition	<i>Lumière à mi-ombre</i>

Particularités

- Fruits comestibles pour la faune
- Espèce mellifère
- Espèce allergisante
- Bon combustible



Cormier

Sorbus domestica L.

Utilisations possibles




Caractéristiques principales

Feuillage	<i>Caduc</i>
Période de floraison	<i>Avril</i>
Humidité du sol	<i>Très variable</i>
pH du sol	<i>Légèrement acide à calcaire</i>
Exposition	<i>Lumière à mi-ombre</i>

Particularités

- Espèce mellifère
- Fruits comestibles blets (cormes)
- Excellent combustible
- Maladie : Feu bactérien



Érable champêtre

Acer campestre L.

Utilisations possibles



Caractéristiques principales

Feuillage	<i>Caduc</i>
Période de floraison	<i>Avril-mai</i>
Humidité du sol	<i>Sec à frais</i>
pH du sol	<i>Faiblement acide à calcaire</i>
Exposition	<i>Lumière à mi-ombre</i>

Particularités

- Espèce mellifère
- Espèce allergisante
- Bon combustible



Frêne commun

Fraxinus excelsior L.

Utilisations possibles




Caractéristiques principales

Feuillage	<i>Caduc</i>
Période de floraison	<i>Avril</i>
Humidité du sol	<i>Très variable</i>
pH du sol	<i>Légèrement acide à calcaire</i>
Exposition	<i>Lumière à mi-ombre</i>

Particularités

- Espèce mellifère
- Espèce allergisante
- Très bon combustible
- Maladie : Chalarose (champignon), en extension dans la région, plantation déconseillée



Hêtre

Fagus sylvatica L.

Utilisations possibles



Caractéristiques principales

Feuillage	<i>Caduc</i>
Période de floraison	<i>Avril-mai</i>
Humidité du sol	<i>Sec à frais</i>
pH du sol	<i>Très variable</i>
Exposition	<i>Ombre</i>

Particularités

- Espèce allergisante
- Fruits comestibles grillés (faînes)
- Excellent combustible



Merisier

Prunus avium L.

Utilisations possibles




Caractéristiques principales

Feuillage	<i>Caduc</i>
Période de floraison	<i>Avril-mai</i>
Humidité du sol	<i>Assez sec à frais</i>
pH du sol	<i>Faiblement acide à neutre</i>
Exposition	<i>Mi-ombre</i>

Particularités

- Fruits comestibles pour la faune
- Espèce mellifère
- Porte-greffe d'arbres fruitiers
- Fruits amers (merises), parfois distillés
- Maladie : sharka (maladie virale)



Orme champêtre

Ulmus minor Mill.

Utilisations possibles



Caractéristiques principales

Feuillage	<i>Caduc</i>
Période de floraison	<i>Mars-avril</i>
Humidité du sol	<i>Assez sec à très humide</i>
pH du sol	<i>Faiblement acide à calcaire</i>
Exposition	<i>Pleine lumière</i>

Particularités

- Espèce allergisante
- Maladie : graphiose (champignon)
- Arbre rural traditionnel, souvent traité en têtard



Saule blanc

Salix alba L.

Utilisations possibles



Caractéristiques principales

Feuillage	<i>Caduc</i>
Période de floraison	<i>Avril-mai</i>
Humidité du sol	<i>Inondé une partie de l'année</i>
pH du sol	<i>Faiblement acide à calcaire</i>
Exposition	<i>Pleine lumière</i>

Particularités

- Espèce mellifère
- Espèce allergisante
- Arbre souvent traité en têtard pour la vannerie (osier)



Tilleul à grandes Feuilles

Tilia platyphyllos Scop.

Utilisations possibles



Caractéristiques principales

Feuillage	<i>Caduc</i>
Période de floraison	<i>Juin-juillet</i>
Humidité du sol	<i>Sec</i>
pH du sol	<i>Faiblement acide à calcaire</i>
Exposition	<i>Ombre à mi-ombre</i>

Particularités

- Espèce mellifère
- Espèce allergisante
- Fleurs odorantes (infusions)



Tremble

Populus tremula L.

Utilisations possibles



Caractéristiques principales

Feuillage	<i>Caduc</i>
Période de floraison	<i>Mars-avril</i>
Humidité du sol	<i>Frais à très humide</i>
pH du sol	<i>Acide à calcaire</i>
Exposition	<i>Pleine lumière</i>

Particularités

- Espèce allergisante

Pour en savoir plus sur la répartition des espèces, se référer à la base de données LOBELIA du CBN du Bassin parisien :

<https://lobelia-cbn.fr/consulter/carte>

Crédits photos : MNHN-CBNP (G. ARNAL, O. BESLIN, L. BOUDIN, J. CORDIER, R. DUPRE, S. GAUTIER, G. HUNAULT, M. LEBLANC, J. MORET, N. ROBOÜAM, E. VALLEZ), Francis OLIVEREAU.