









POUR UNE PRISE EN COMPTE DE LA BIODIVERSITE DANS LA GESTION DE NOS ESPACES VERTS

LISTE DES ESSENCES A PRIVILEGIER DANS LES AMENAGEMENTS PAYSAGERS ET PLANTATIONS DES ESPACES VERTS ET JARDINS

Depuis 2009, le Conseil général de Haute-Savoie s'est engagé avec le concours de la FRAPNA Haute-Savoie (Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature) dans une démarche de gestion raisonnée différenciée des bords de routes départementales : fauchage raisonné, réduction de l'utilisation des pesticides, réduction de l'utilisation de sel de déneigement, lutte contre les espèces exotiques envahisantes,... autant d'initiatives qui permettent aujourd'hui de mieux concilier sécurité des usagers et prise en compte de la biodiversité !

En 2012 pour prolonger cette démarche, la FRAPNA Haute-Savoie propose une plaquette expliquative sur le choix des essences à privilégier dans les espaces verts et les jardins des communes du département.
Cette liste d'espèces répond aux demandes les plus courantes des communes, en conciliant au mieux la pratique d'entretien des espaces verts et la prise en compte de la biodiversité et en limitant la dissémination d'espèces exotiques.

« Certifié conforme par le
Maire et annexé à la présente
délibération approuvant le PLU
en date du 20 mars 2019. »
Le Maire, M. Frédéric BUDAN

haute savoie
Conseil Général

FRAPNA



Cornouiller sanguin
(Cornus sanguineum)



Noisetier
(Corylus avellana)



Eglantier
(Rosa canina)



Hêtre
(Fagus sylvatica)



Viorne obier
(Viburnum opulus)



Clématite des haies
(Clematis vitalba)



Fusain d'Europe
(Evonymus europaeus)



Charme commun
(Carpinus betulus)



Lierre
(Hedera helix)



Erable champêtre
(Acer campestre)



Sureau noir
(Sambucus nigra)



Sorbier des oiseaux
(Sorbus aucuparia)



Tilleul
(Tilia platyphillos



Aubépine
(Sambucus nigra)



Troëne commun
(Ligustrum vulgare)

Photos FRAPNA : Natacha Leurion Pansiot

ESSENCES ARBUSTIVES / ARBORESCENTES / ESPECES GRIMPANTES

Comment améliorer la biodiversité des massifs arbustifs

Un massif en bonne santé se caractérise par une diversité d'espèces et de différentes structuration de strates (herbacée, arbustive, arborée, grimpante) tout en densifiant le massif (3 ou 4 plants/m² ou 2 plants/ml). Cela contribue à lutter contre les parasites, maladies, invasives, à diminuer les actions sur le désherbage et à favoriser la création de zone refuge pour les espèces locales.

Cette liste préconise des espèces indigènes lors du choix d'essences chez les pépiniéristes.

Lalisted'espèces :

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Caractéristiques du sol	Autres caractéristiques	Intérêts faunistiques	Caractéristiques d'implantation et de reproduction végétative	Aspect ornemental	Techniques d'entretien
Espèces arborées (hauteur : >7m à 20m)							
Aulne glutineux et Aulne blanc	Alnus glutinosa Alnus incana	Sols humides, Espèce peu exigeante quant à la qualité des sols (acide à basique) Sols sableux, limoneux, argileux.	Feuillage caduque Espèce fixatrice d'azote Croissance rapide Essence de pleine lumière	-	Adaptés en pied de berge	Feuillage automnale Fructification pourpre en hiver	Taille : haut-jet, cépée, têtard
Charme commun	Carpinus betulus	Sols secs à frais, Sols moyennement acide à basique.	Croissance rapide Essences de demi-ombre	-	Adaptés en milieu de berge	Feuillage marcescent en hiver Feuillage gaufré	Taille : haie, cépée
Châtaignier	Castanea sativa	Sols secs à frais, Sols plutôt acide.	Croissance lente	Fort intérêt mellifère Intérêt alimentaire (petits mammifères, insectes)	Adaptés en haut de berge	Feuillage couleur jaune automnale Fruit : bogue	Taille : haut-jet, cépée
Chêne	Quercus robur Quercus petraea Quercus pubescens	Sols frais à très secs selon les espèces, Sols basiques à légèrement acide.	Feuillage caduque Croissance lente Essences d'ombre ou de pleine lumière selon les espèces	Intérêt alimentaire (oiseaux, insectes, petits mammifères)	Adaptés en haut de berge	-	Taille : haut-jet
Erable champêtre	Acer campestre	Sols secs et humides, Préférence pour les sols riches en calcaire ou marneux, Sols argileux et limoneux.	Feuillage caduque Croissance lente Essences de demi-ombre à pleine lumière	Intérêt mellifère	Adaptés en haut de berge Plantation en novembre-décembre Bouturage en juillet	Feuillage automnale jaune orangé Fructification samares	Taille : haut-jet, cépée, haie taillée

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Caractéristiques du sol	Autres caractéristiques	Intérêts faunistiques	Caractéristiques d'implantation et de reproduction végétative	Aspect ornemental	Techniques d'entretien
Hêtre	Fagus sylvatica	Sols frais à secs, Sols calcaire à légèrement acide.	Croissance lente Essences d'ombre lors de sa croissance	Intérêt alimentaire (petits mammifères, insectes)	Adaptés en haut de berge	Feuillage marcescent en hiver	Taille : haut-jet, cépée et têtard
Tilleul	Tilia platyphillos Tilia cordata	Sols basiques à faiblement acides.	Feuillage caduque Croissance lente Essence de demi-ombre	Intérêt mellifère Habitat pour insectes	Adaptés en haut de berge	-	Taille : haut-jet et têtard
Saules	Salix alba, Salix purpurea, Salix alba, Salix viminalis, Salix caprea, Salix atrocinerea…	Sol humide, Sol légèrement acide à neutre, Sol limoneux et argileux.	Feuillage caduque Croissance rapide Essence de pleine lumière	Intérêt mellifère	Adapté en pieds de berge. Plantation novembre-mars Bouturage février-mars	Couleur du bois en hiver selon les espèces (jaune orange rouge)	Taille : haut-jet, cépée, têtard et haie taillée
Espèces arbustives (hauteur : 1 à 7m)							
Aubépine monogyne Aubépine épineuse	Crataegus monogyna, Crataegus oxyacantha	Sols secs à peu humides, Sols acides à basiques, Sols argileux et limoneux.	Croissance moyenne à rapide Feuillage caduque Essence de demi-ombre à pleine lumière	Intérêt mellifère Intérêt alimentaire (oiseaux, insectes, petits mammifères)	Sensibles au feu bactérien. Se renseigner avant plantation (accord auprès du service de protection des végétaux)	Feuillage découpé, avec baie rouge.	Taille : arbuste et haie taillée
Cornouiller mâle	Cornus mas	Sols secs à frais ? Sols neutres à calcaires.	Croissance rapide Feuillage caduque Essence de lumière à demi-ombre	Intérêt mellifère Intérêt alimentaire	Rejette facilement	Rameaux verts	Taille : arbuste et haie taillée
Cornouiller sanguin	Cornus sanguinea	Sols secs à assez humides, Sols basiques à légèrement acides, Sols limoneux et argileux.	Croissance rapide Feuillage caduque Essence de lumière à demi-ombre	Intérêt mellifère Intérêt alimentaire (insectes, petits mammifères, oiseaux)	Adapté en milieu de berge Plantation en novembre-décembre. Bouturage en juillet	Feuillage automnale rouge Rameaux rouge en pleine lumière	Taille : arbuste et haie taillée

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Caractéristiques du sol	Autres caractéristiques	Intérêts faunistiques	Caractéristiques d'implantation et de reproduction végétative	Aspect ornemental	Techniques d'entretien
Espèces arbustives (hauteur : 1 à 7m)							
Eglantier	Rosa canina	Sols secs, Sols légèrement acides à basiques, Sols sableux argileux et limoneux.	Croissance rapide Feuillage caduc Essence de pleine lumière	Intérêt mellifère Intérêt alimentaire oiseaux, insectes, petits mammifères)	Adapté en haut de berge. Possibilité de semer au printemps. Bouturage en septembre.	Floraison rose pâle Fructification orangé à rouge en hiver	Taille : arbuste et haie taillée
Fusain d'Europe	Euonymus europaeus	Sols secs ? Sols neutres à calcaires.	Feuillage caduc	Intérêt mellifère Intérêt alimentaire (oiseaux, insectes, petits mammifères)	Adapté en haut de berge. Rejets de souche. Plantation ou repiquage possible en novembre.	Fructification rose (bonnet d'évêque)	Taille : arbuste et haie taillée
Noisetier	Coryllus avellana	Sols secs et humides, Sols acides à calcaires.	Croissance moyenne Feuillage caduc Essence de demi-ombre à pleine lumière	Intérêt mellifère Intérêt alimentaire (oiseaux, insectes, petits mammifères)	Adapté en haut de berge. Drageonne et rejette.	Fructification (Noisette) Chatons jaunâtres pendants	Taille : arbuste, cépées et haie taillée
Prunellier (épine noire)	Prunus spinosa	Sols secs à frais, Sols neutres, Sols limoneux et argileux.	Croissance moyenne Feuillage caduque Essence de demi-ombre à pleine lumière	Intérêt mellifère Intérêt alimentaire (oiseaux, insectes, petits mammifères	Adapté en haut de berge. Drageonne.	Floraison blanche au printemps	Taille : arbuste et haie taillée
Ronce commune	Rubus fruticosus	Sols frais, Sols neutres, Sols limoneux argileux,	Croissance rapide Feuillage caduque Essence de pleine lumière	Intérêt mellifère Intérêt alimentaire (oiseaux, mammifères, insectes)	Bouturage Marcottage	Floraison blanche rosée Fructification mûres	Taille : haie taillée
Sorbier des oiseaux	Sorbus aucuparia	Sols frais, Sols acides, Sols sableux et limoneux.	Croissance rapide Feuillage caduque Essence de demi-ombre à pleine lumière	Intérêt mellifère Intérêt alimentaire (oiseaux,	Rejette.	Fructification de grappe de baies rouges orangées	Haut-jet, cépée, haie taillée
Sureau noir	Sambucus nigra	Sols frais et humides, Sols neutres à basiques, Sols limoneux et argileux.	Croissance rapide Feuillage caduque Essence de demi-ombre à pleine lumière	Fort Intérêt mellifère Intérêt alimentaire (oiseaux, insectes)	Adapté en pied de berge. Adapté aux terrains difficiles Bouturage possible.	Fructification de grappe de baie noir Grande inflorescence blanche	Taille : arbuste et haie taillée

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Caractéristiques du sol	Autres caractéristiques	Intérêts faunistiques	Caractéristiques d'implantation et de reproduction végétative	Aspect ornemental	Techniques d'entretien
Troène commun	Ligustrum vulgare	Sols secs et humides, Sols légèrement acides à basique.	Croissance rapide Plante de demi-ombre à pleine lumière	Intérêt mellifère. Intérêt alimentaire (oiseaux, insectes, petits mammifères)	Rejet de souche et marcottage. Plantation en novembre et bouturage en juin.	Feuillage semi-persistant en hiver avec des teintes pourpres Floraison blanche	Taille : arbuste ou haie taillée
Viorne lantane	Viburnum lantana	Sols secs à frais, Sols basiques.	Croissance rapide Feuillage caduque Essence de lumière	Intérêt alimentaire (oiseaux)	Adapté en milieu de berge.	Floraison blanche odorante Fruits rouge puis noir bleuâtre	Taille : arbuste ou haie taillée
Viorne obier	Viburnum opulus	Sols secs à frais, Sols légèrement acides à basique, Sols argileux et limoneux.	Croissance moyenne Feuillage caduque Plante de demi-ombre à pleine lumière	Intérêt mellifère Intérêt alimentaire (oiseaux)	Adapté en milieu de berge.	baies rouges luisant persistant en hiver Floraison blanche en corymbe	Taille : arbuste ou haie taillée
Espèces grimpantes							
Chèvrefeuille des haies Chèvrefeuille des bois	Lonicera xylosteum, Lonicera peryclimenum	Sols frais, Sols basique à acide selon les deux espèces.	Essences de demi-ombre à pleine lumière Jusqu'à 4m de hauteur	Intérêt alimentaire (insectes) Habitats	Bouturage	Floraison blanchâtre à jaunâtre odorante	Supporte la taille
Clématite	Clematis vitalba	Sols secs à frais, Sols calcaires.	Croissance rapide Essence de pleine lumière Jusqu'à 15 ou 20 m de hauteur	-	Marcottage début printemps Bouturage fin printemps	Floraison d'un vert blanchâtre Fructification aspect plumeux persistant en hiver	Supporte la taille
Houblon	Humulus lupulus	Sols plutôt basiques et bien aérés.	Essence d'ombre Jusqu'à 10 m de hauteur	-	Bouturage de jeunes tiges en avril-mai Plantation de tronçons de racines à 10cm de profondeur Adapté au bord de cours d'eau	Feuillage	Pas besoin de taille
Lierre	Hedera helix	Sols acides à basiques, Sols assez frais.	Essence de demi-ombre ou ombre Jusqu'à 30 m de haut	Intérêt alimentaire (insecte en hiver)	Bouturage en automne Marcottage au printemps	Feuillage persistant Floraison jaune verdâtre	Supporte la taille
Navet du diable	Bryonia dioïca	Sols frais, Sols calcaire.	Essence de demi-ombre Jusqu'à 6 m de haut	Intérêt alimentaire (insecte)	Plante vivace dioïque Semis	Floraison verdâtre blanchâtre	Pas besoin de taille

Contactez les Pépiniéristes :

La plupart des pépiniéristes vendent des espèces exotiques, lors de l'achat précisez que vous-voulez des espèces indigènes !

Une pépinière semble être spécialisée dans la vente d'essences indigènes :

- Pépinière du Gros de Vaud : mail de-castro@pepinieres-foret.ch

PRAIRIES FLEURIES

Pour choisir ses compositions de semences il faut faire attention:

- A la provenance géographique (les espèces doivent être indigènes)
- A l'altitude (préférée des semences que l'on retrouve aux différents étages altitudinaux)
- Aux conditions édaphiques (sol sec ou humide; maigre ou riche en nutriments; basique à faiblement acide ou très acide.)

Liste des plantes que vous pouvez choisir dans les sachets de semis.

Taxons	Nom scientifique	Caractéristiques du sol	Autres caractéristiques	Intérêts faunistiques	Aspect ornemental
Graminées	Agrostis stolonifera, Festuca rubra, Holcus lanatus, Lolium perenne, Phleum pratense (une vingtaine d'espèces)	Sols secs à humides voire immergés) selon les espèces.	Bonne couverture au sol (complémentarité au niveau de l'espace aérien) et pouvoir stabilisateur (diversité des systèmes d'enracinement) Port court ou élevé selon les espèces Productivité variable selon les espèces Certaines espèces supportent mieux que d'autres le piétinement ou l'entretien fréquent	-	Feuillage aérien donnant du volume dans les massifs Gazon vert (lord de la tonte)
Légumineuses	Lotus corniculatus, Trifolium pratense, Anthyllis vulneraria, Onobrychis vicifolia (une dizaine d'espèces)	Sols secs à frais, selon les espèces.	Capacité à fixer l'azote atmosphérique par l'intermédiaire des nodosités (plus grande autonomie par rapport à l'approvisionnement en éléments nutritifs Possibilité d'utilisation sur remblais hétérogènes Bonne tolérance à la sécheresse	-	Floraison : forte palette de couleurs
Composées	Achillea millefolium	Sols secs à frais, Sols calcaire.	Espèce pouvant être cultivée en montagne à plus de 1000 m d'altitude.	Intérêt mellifère	Floraison : forte palette de couleurs, jaune, blanche, bleu,…
	Leucanthemum vulgare	Sol sec à frais.	Espèce pouvant être cultivée en montagne à plus de 1000 m d'altitude.		
	Bellis perennis	Sol sec à frais.			
	Cichorium intybus	Sols frais à peu secs.			
	Centaurea cyaneus	Sols drainés riches et meubles.	Messicole Espèce pouvant être cultivée en montagne à plus de 1000 m d'altitude.		
	Tragopogon pratensis	Sols secs à frais, Sols riches.	Espèce pouvant être cultivée en montagne à plus de 1000 m d'altitude.		

Taxons	Nom scientifique	Caractéristiques du sol	Autres caractéristiques	Intérêts faunistiques	Aspect ornemental
Autres	Plantago lanceolata, Plantago media	Sols secs à frais, selon les espèces.	Espèce pouvant être cultivée en montagne à plus de 1000 m d'altitude.	Plante faiblement nectarifère	Floraison : petites floraisons blanches rosées
	Daucus carota	Sols sec à frais, Sols plus ou moins riches.	Espèce pouvant être cultivée en montagne à plus de 1000 m d'altitude.	Faible intérêt mellifère	Floraison : ombelles blanches
	Dipsacus fullonum	Sol sec à frais.	Espèce pouvant être cultivée en montagne à plus de 1000 m d'altitude.	Habitats pour insectes	Floraison dégradé de bleu au violet Feuillage coriace et piquant
	Linum alpinum Linum perenne	Sols secs, Sols plutôt calcaire.	Espèce pouvant être cultivée en montagne à plus de 1000 m d'altitude.	-	Floraison bleue claire
	Aquilegia vulgaris	Sols calcaire, Sols légers, humifères, frais et bien drainé.	Espèce pouvant être cultivée en montagne à plus de 1000 m d'altitude.	Intérêt mellifère	Feuillage découpé Floraison violacée, rosée, voir blanche de forme étoile
	Agrostemma githago	Sols drainées et meubles.	Messicole, espèce pouvant être cultivée en montagne à plus de 1000 m d'altitude.	-	Floraison : rose pourpre
	Papaver rhoeas	Sol sec à frais.	Messicole	Faible intérêt mellifère	Floraison rouge
	Myosotis alpestris	Sols secs à frais.	Espèce pouvant être cultivée en montagne à plus de 1000 m d'altitude.	-	Floraison : petites fleurs bleues
	Echium vulgare	Sol sec à frais.	Espèce pouvant être cultivée en montagne à plus de 1000 m d'altitude.	Intérêt mellifère	Floraison en épis bleus-violets
	Saponaria ocymoïdes Saponaria officinalis	Sols secs à frais, Sols riche.	-	-	Floraison de rose à pale à foncé
	Salvia pratensis	Sol sec à frais, Sol calcaire.	Espèce pouvant être cultivée en montagne à plus de 1000 m d'altitude.	Faible intérêt mellifère	Floraison en épi bleue violacée
	Viola tricolor Viola arvensis	Sol plutôt acide, Sol sec à frais.	Espèce pouvant être cultivée en montagne à plus de 1000 m d'altitude.	Faible intérêt mellifère	Floraison petites fleurs tricolore (jaune violet et blanche)
	Malva moschata Malva sylvestris	Sol plutôt acide.	Espèces pouvant être cultivée en montagne à plus de 1000 m d'altitude.	Faible intérêt mellifère	Floraison mauve
	Polygonum bistorta	Sol humide, Sol calcaire.	Espèce résistant au sol engorgé d'eau.	-	Floraison en épi compacté rose pâle à foncé

Contactez les Semenciers :

Les semenciers commencent à se diversifier dans cette branche dite « espèces indigènes » en voici quelques uns :

France :

- http://www.phytosem.com
- http://jardindesauveterre.com

Suisse :

- UFA semences (fenaco) : http://www.ufasamen.ch
- Eric Schweizer Semences: http://www.ericschweizer.ch
- Otto Hauenstein Semences SA : http://www.hauenstein.ch

LES « INDISERABLES » : LES PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES

Toutes ces espèces peuvent se retrouver chez nos pépiniéristes

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Origine	Dissémination	Nuisance dues à l'invasion	Espèces de substitution	Méthodes de contrôle
Espèces arborées						
Ailante	Ailanthus altissima	Chine	Graines et racines	Production de substance toxique inhibant le développement des autres espèces.	Frênes communs	Arrachage manuel avec évacuation des résidus.
Erable negundo	Acer negundo	Chine	Graines, boutures	Dégradation des forêts alluviales par la formation de peuplements monospécifiques.	Peupliers, Erables sycomores et planes, ou Bouleaux	Écorçage (1m -2m) répété, provoque l'épuisement du peuplement Arrachage pour les jeunes plants avec destruction.
Robinier	Robinia pseudo-acacia	Est des Etats-Unis	Graines et drageons	Diminution de la biodiversité, par un peuplement monospécifiques Augmentation de l'apport azoté dans le sol.	Faux ébenier, Baguenaudier	Arrachage des jeunes plants Écorçage (1m -2m) répété, provoque l'épuisement du peuplement.
Espèces arbustives						
Faux indigo	Amorpha fruticosa	Amérique du Nord	Graines et boutures	Diminution de la biodiversité Concurrence sur les espèces indigènes Augmentation de l'apport azoté dans le sol.	Cornouiller	Arrachage, fauches des jeunes plants
Arbre aux papillons	Buddleja davidii	Chine	Graines, boutures	Diminution de la biodiversité Concurrence sur des espèces pionnières indigènes	Sureau noir, Viorne obier ou lantane	Arrachage avec destruction et évacuation des débris et revégétalisation de la zone envahie.
Sumac de Virginie	Rhus typhina	Amérique du Nord	Graines et rhizomes	Diminution de la biodiversité Concurrence sur les espèces indigènes Plante pouvant provoquer des allergies (dermatose)	Sorbier des oiseleurs	Arrachage des rhizomes et des jeunes plants avec destruction.

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Origine	Dissémination	Nuisance dues à l'invasion	Espèces de substitution	Méthodes de contrôle
Espèces herbacées						
Berce du Caucase	Heracleum montegazzianum	Caucase	Graines	Diminution de la biodiversité (grande compétitivité) Plante pouvant provoquer des allergies (dermatose au contacte du soleil)	Carottes sauvages, Berce des jardins	Arrachage manuel avec fauches répétées (mettre des protections).
Herbe de la pampa	Cortaderia selloana	Amérique du Sud	Graines	Diminution de la biodiversité Concurrence sur les espèces indigènes	Graminées, Cypéracées	Arrachage mécanique des touffes avec exportation de la matière. Coupe manuelle répétée des tiges.
Impatiens	Impatiens balfouri Impatiens glandulifera Impatiens parviflora	Himalaya	Graines, boutures	Diminution de la biodiversité Concurrence sur les espèces indigènes	Epilobe à petites feuilles	Fauche des colonies avant floraison.
Les asters américains	Aster lanceolatus Aster novi-belgii Aster x salignus	Amérique du Nord	Graines, rhizomes	Diminution de la biodiversité par la colonisation de peuplements monospécifiques	Marguerites, Achillées millefeuilles	Fauches avec exportations de la matière. 2 fauches/an (1 en juin ; 1 début septembre).
Raisin d'amérique	Phytolacca americana	Amérique du Nord	Graines	Diminution de la biodiversité Concurrence sur les espèces indigènes	Cornouillers, Fusain d'Europe	Supporte mal ombrage. Arrachage des jeunes plants avec exportation et destruction des résidus. Coupe ou broyage avant la fructification.
Renoué du Japon	Reynoutria japonica Reynoutria sachalinensis Reynoutria x bohemica	Asie orientale	Rhizomes et boutures	Accélère l'érosion des berges Impacte négatif sur la biodiversité Gêne la circulation et l'accès des usagers	Eupatoire chanvrine, Filipendule	Arrachage des jeunes plants Fauche avec recouvrement d'un géotextile au sol et plantation de ligneux.
Rudbéckie laciniée	Rudbeckia laciniata	Est de l'Amérique du Nord	Graines et rhizomes	Diminution de la biodiversité Concurrence sur les espèces indigènes	Salsifis des prés	Arrachage des rhizomes avec destruction. Fauche répété sur plusieurs années. Supporte mal ombrage.
Solidage géant	Solidago gigantea Solidago canadensis	Amérique du Nord	Graines et rhizomes	Diminution de la biodiversité Concurrence sur les espèces indigènes	Tanaisie, Barbée commune	2 fauches/an (1 avant floraison ; 1 en septembre) avec exportation de la matière.
Espèces grimpantes						
Vigne vierge	Parthenocissus inserta	Amérique du Nord	Graines	Etouffement de la végétation	Houblon, Chèvre feuille des bois	Arrachage avant la floraison



Carotte sauvage
(Daucus carota)



Ancolie
(Aquilegia vulgaris)



Graminée
(Poacées)



Coquelicot
(Papaver rhoeas)



Trèfle
(Trifolium pratense)



Bleuet
(Centaurea cyaneus)



Pensée
(Viola arvensis)



Salsifi
(Tragopogon pratensis)



Bistorte
(Polygonum bistota)



Vipérine
(Echium vulgare)



Plantain intermédiaire
(Plantago media)




Berce des jardins
(Heracleum sphondilium)



Marguerite
(Leucanthemum vulgare)



Sainfoin
(Onobrychis vicifolia)




Lotier
(Lotus corniculatus)

Photos FRAPNA : Natacha Leurion Pansiot

UN APPUI OFFERT AUX COMMUNES POUR ALLER PLUS LOIN !

Dans le cadre de la poursuite de son partenariat avec le Conseil général de Haute-Savoie, la FRAPNA propose tout au long de l'année 2012 d'accompagner les communes qui souhaitent mieux prendre en compte la biodiversité sur leurs espaces verts et autres espaces publics. Pour cela, la FRAPNA se tient à la disposition des communes pour faire en une demi-journée le point sur les pratiques d'entretien en cours et réfléchir aux possibilités d'action (adaptation des pratiques, sensibilisation des habitants, suivi de la biodiversité,…).



Contact

Natacha Leurion-Pansiot - Chargée de mission Natura 2000 et Patrimoine Naturel
FRAPNA Haute-Savoie
natacha.leurionpansiot@frapna.org
04 50 67 16 17

haute savoie
Conseil Général

FRAPNA